

《手術前後の投与に注意を要する薬剤》

抗血小板作用を持つ薬剤／静脈血栓注意薬

改定8版

分類	一般名	商品名(先発品名)	製剤写真	休業期間の目安
抗凝固薬	アピキサバン	エリキュース錠		1日(大手術や出血の危険性多い場合は2日以上)
	エドキサバントシル酸塩水和物	リクシアナ錠		1日
	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	ブラザキサカプセル		1日(大手術や出血の危険性多い場合は2日以上)
	リバーロキサバン	イグザレルト錠		1日
	ワルファリンカリウム	ワーファリン錠		5~7日
抗血小板薬	アスピリン	バイアスピリン錠、アスピリン末バファリン配合錠[院外]		7~10日
	アスピリン+クロピドグレル硫酸塩	コンプラミン配合錠		14日
	アスピリン+ランソプラゾール	タケルダ配合錠[院外]		7~10日
	クロピドグレル硫酸塩	クロピドグレル錠(プラビックス)		14日
	サルボグレラート塩酸塩	サルボグレラート錠(アンブラーグ)		1~2日
	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠(プレタール)		3~4日
	チクロピジン塩酸塩	パナルジン錠 [院外]		10~14日
	プラスグレル塩酸塩	エフィエント錠		14日
	ベラプロストナトリウム	ベラプロストNa錠(ドルナー)		1~2日
脂質異常症薬	イコサペント酸エチル	エパデールS		10日前後
	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ粒状カプセル [院外]		10日前後
血管拡張薬	リマプロスタアルファデクス	リマプロスタアルファデクス錠(オパルモン)		1~2日
冠血管拡張薬	ジラゼブ塩酸塩水和物	ジラゼブ塩酸塩錠(コメリアンコーフ)		2~3日
	ジピリダモール	ジピリダモール錠(ペルサンチン) ペルサンチンLカプセル		1~2日
	トラピジル	トラピジル錠(ロコルナール)		2~4日(休業の必要なしという報告もあり。)
脳代謝改善薬	イブジラスト	ケタスカプセル		3日
	ニセルゴリン	ニセルゴリン錠(サアミオン)		2~3日
	イフェンプロジル酒石酸塩	イフェンプロジル酒石酸塩(セロクラール)		2日
骨粗鬆症治療薬	ラロキシフェン塩酸塩	ラロキシフェン錠(エビスタ)		3日 歩行開始に合わせて服用開始
	バゼドキシフェン酢酸塩	ビビアント錠		
卵胞ホルモン製剤(月経困難症治療薬)(経口避妊薬)	結合型エストロゲン	ブレマリン錠		術前4週間
	エチニルエストラジオール・ノルエチステロン	ルナベル配合錠ULD ルナベル配合錠LD[院外]		術前4週間、術後2週間
	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	ブラノバール配合錠		
黄体ホルモン製剤	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	ヒスロンH錠		血栓症を起こす恐れの高い患者: 術後1週間

[院外]: 院外専用薬

参考文献: 添付文書・インタビューフォーム・月刊薬事Vol.42・臨床麻酔Vol.26・NIKKEI Drug Information・スズケンDI

[2020年6月 薬局 医薬品情報室]