

《手術前後の投与に注意を要する薬剤》 女性ホルモン関連製剤

卵胞ホルモン製剤は、血液凝固能力を上昇させる作用をもっているため、血栓症のリスクを高める恐れがあります。

分類	一般名	薬品名	術前休業期間	術後再開の目安		
骨粗鬆症治療薬 (SERM)	ラロキシフェン塩酸塩	エビスタ錠(先) ラロキシフェン塩酸塩錠(後)	3日間 ^③	完全に歩行可能となつてから ^③		
	パゼドキシフェン酢酸塩	ビビアント錠(先) パゼドキシフェン錠(後)				
子宮内膜症治療薬	ダナゾール	ボンゾール錠	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する			
	ジエノゲスト	ディナゲスト錠 ジエノゲスト錠				
卵胞ホルモン	エストラジオール	エストラーナテープ	4週間 ^④	完全に歩行可能となつてから ^④		
		ル・エストロジェル				
		デイビゲル				
	エストリオール	ジュリナ錠				
		ホーリン錠				
		エストリール錠				
結合型エストロゲン	プレマリン錠	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する				
エストラジオール吉草酸エステル	プロギノン・デポー筋注 ペラニンデポー筋注					
抗がん剤 (卵胞ホルモン)	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム	エストラサイトカプセル	4週間 ^①	術後2週間 ^①		
	エチニルエストラジオール	プロセキソール錠				
黄体ホルモン	プロゲステロン	プロゲホルモン筋注用	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する			
		プロゲステロン筋注				
		ルティナス錠				
		ウトロゲスタン腫用カプセル				
		ワンクリノン腫用ゲル				
		ルテウム腫用坐剤				
		エフメノカプセル				
	ジドロゲステロン	デュファスト錠				
	ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル	プロゲデポー筋注				
	ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル	プロゲストーンデポー筋注				
	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	プロベラ錠				
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠					
クオルマジン酢酸エステル	ルトラール錠					
ノルエチステロン	ノアルデン錠					
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	ヒスロン錠5	休業の必要なし ^③ ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討	術後1週間 ^③			
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	ヒスロンH錠200mg					
卵胞・黄体ホルモン配合剤	ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル・エストラジオール安息香酸エステル	ルテスデポー注	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する			
	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	プラノバル配合錠				
	エストラジオール・ノルエチステロン	メノエイドコンビパッチ				
月経困難症 (卵胞・黄体ホルモン配合剤)	エストラジオール・レボノルゲストレル	ウェールナラ配合錠	4週間 ^②	術後2週間 ^②		
	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール	ヤーズ配合錠				
	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	ヤーズフレックス配合錠				
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	ルナベル配合錠LD、ULD フリウエル配合錠LD、ULD				
低用量ピル (卵胞・黄体ホルモン配合剤)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	ジェミーナ配合錠	4週間 ^{②③}	術後2週間 ^{②③}		
	シンフェーズT28錠					
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	アンジュ21錠、28錠 トリキュラー錠21、28 ラベルフィーユ21錠、28錠				
	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	マーベロン21、28 ファボワール錠21、28				
緊急避妊薬	レボノルゲストレル	ノルレボ錠	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する			
子宮内黄体ホルモン放出シス	レボノルゲストレル	ミレーナ52mg				
排卵誘発剤	シクロフェニル	セキソビット錠				
	クロミフェンクエン酸	クロミッド錠				
GnRH アゴニスト	ブセレリン酢酸塩	スプレキュア点鼻液			休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する	
	ブセレリン酢酸塩	ブセレリン点鼻液				
	ナファレリン酢酸塩	ナサニール点鼻液				
	ナファレリン酢酸塩	ナファレリン点鼻液				
	ゴセレリン酢酸塩	ゾラデックス1.8mgデポ				
	リュープロレリン酢酸塩	リュープリン注射用1.88mg				
GnRH アンタゴニスト	セトロリック酢酸塩	セトロタイド注射用				
	ガニレリクス酢酸塩	ガニレスト皮下注				
女性・男性ホルモン配合剤	レルゴリクス	レルミナ錠	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する			
	テストステロンエナント酸エステル・エストラジオール吉草酸エステル	プリモジアン・デポー筋注 ダイホルモン・デポー注				
アロマターゼ阻害薬	アナストロゾール	アリミデックス錠(先) アナストロゾール錠(後)	休業の必要なし ^① ※ 長期臥床患者など血栓のリスクが高い場合 → 休業を検討し、凝固能を確認して再開する			
	レトロゾール	フェマーラ錠(先)				
		レトロゾール錠(後)				

料： ①メーカー回答 ②HRTガイドライン2017 ③添付文書、インタビューフォーム ④プレマリン錠の添付文書より統一